

祛瘀以消毒肿,黄芪补气养血,诸药合用,令风邪散,毒邪祛而病愈。

本方兼外用熏洗,使药液直接由局部皮肤渗透吸收,促进血液循环,药性能更快,更直接作用于病变局部,外用内服,更奏其功。

维生素E霜的研配及临床应用

廖好春

(泉州市皮肤病防治院)

维生素E霜对老年性角化病,下肢溃疡,日光性皮炎等皮肤病均有良好的疗效。本制剂在不增加维生素E含量的基础上,在乳膏中加入皮肤透皮吸收剂——氮酮,从而增加了维生素E的透皮作用,进一步增强了维生素E霜的临床应用范围及效果。

1. 处方:硬脂酸 10g、单硬脂酸甘油酯 7g、白凡士林 8.5g,甘油 8.5g,十二烷基硫酸钠 1g、三乙醇胺 0.2ml、尼泊金乙酯 0.1g,氮酮 2ml,维生素E 2g,香精适量,蒸馏水 60ml。

2. 制备:取处方油相(硬脂酸、单硬脂酸甘油酯、白凡士林、尼泊金乙酯)、水相(甘油、十二烷基硫酸钠、三乙醇胺、蒸馏水)分别加热至 75℃,然后将油相缓缓加入至水相中,随加随搅,待冷却至 50℃再分别加入维生素E,氮酮及香精,不断搅拌至乳化完全,乳膏即制成。

3. 质量控制:本品外观洁白,质地均匀、细腻、成品分别于 55℃烘箱 6h, -15℃温度下放置 24h 无油水分离现象。将成品 10g,装入带刻度的离心管内,在转速 2500 转/min 的离心机上离心 30min,无分层现象。将本品涂在皮肤上给药 24h 观察无红肿、起疱、丘疹等刺激现象。

4. 临床应用:维生素E霜在皮肤病治疗的临床应用上具有广泛的用途。作为我院自配的药剂,在长期的临床应用中取得了较为满意的疗效。维生素E霜具有营养、滋润皮肤的作用,并能有效地保护皮肤免受外界的有害刺激。在临床实践中我们将维生素E霜应用于治疗老年性角化病,毛周角化症,手足皲裂、日光性皮炎、神经性皮炎,寻常性痤疮,口唇炎、汗孔角化症、常跖角化症,疣状肢端角化症、进行性对称性红斑角皮症等疾病的治疗中,取得了很好的效果,在慢性湿疹,异位性皮炎,鳞状毛束角化,扁平苔藓、萎缩性慢性肢端皮炎、口周皮炎、汗疱疹,白色

糖疹等病的治疗中也取得了较满意的效果。维生素E有抗衰老的功效,在实践中,我们将配制成的具有一定渗透力的维生素E霜用于营养皮肤、延缓皮肤衰老,给过长期临床观察,发现取得了一定效果,皮肤在使用了维生素E霜后,抵抗光、热、寒等不良刺激的能力明显加强,使皮肤更具有弹性、光泽、细嫩,在延缓皱纹出现方面也具有一定的作用。在长期的实践中,我们发现维生素E霜对因日光、妊娠及长期口服避孕药的黄褐斑患者具有一定的疗效,在此病的治疗中开辟了一条新的途径。总之,维生素E霜是一种疗效肯定的皮肤外用药物,在皮肤病的外用治疗中具有广泛应用。

头孢噻肟钠治疗婴儿重症肺炎的体会

王俊民 王雅云

(漳浦县医院)

肺炎是我国儿科四大常见疾病之一。重症肺炎是小儿肺炎的主要死亡原因。我院于 1995 年 12 月~1996 年 12 月,用上海先锋药业公司生产的头孢噻肟钠治疗婴幼儿重症肺炎取得良好的效果。现报道如下。

1. 临床资料:1.1 分组 对照组 40 例(男 30 女 10),治疗组 30 例(男 18、女 12)年龄:新生儿 6 例,1 岁以内 46 例,1~2 岁 18 例,男与女比例约 2:1。1.2 临床特点:均有咳嗽、发烧、气促、喘憋,发绀明显、烦躁不安或精神萎靡。肺部闻及密集中小水泡音。心音低钝,心率>160 次/min,肝大,胸片 X 线示云雾状阴影,末梢血象:白细胞>10×10⁹/L, S>70%, L<30%。

2. 治疗方法及结果:两组均给予镇静、吸痰、超声雾化,随时吸痰,强心利尿,激素等综合治疗。治疗组:用头孢噻肟钠。剂量:新生儿为 0.05g/kg/d,1 月~2 岁剂量为 0.05~0.1g/(kg·d),加入葡萄糖中静滴,日 2 次。对照组:用先锋霉素 V 号,剂量 50~200μg/(kg·d)或氨苄青霉素 50~200mg/(kg·d),静滴,日 1 次。治疗 3d 后:治疗组:无发烧及发绀,偶有微咳。心衰控制,发绀及喘憋明显改善。肺部罗音明显减少。对照组:无发烧,仍咳嗽、心衰控制。发绀及喘憋改善不明显。肺部罗音减少 18 例,12 例无明显变化。治疗 7d 后:治疗组:临床症状消失,两肺呼吸音清,无罗音,X 线摄片:32 例回报:正常心肺,8 例有小的点,片状阴影,痊愈率达 80%。对照